

## Alcool modifié 70°

### Indication

- Antiseptie des petites plaies superficielles et peu étendues.
- Préparation de la peau avant injection ou ponction.

### Posologie

VOIE CUTANEE.

Appliquer sur la surface à traiter au moyen d'une compresse.

Jeter la compresse après usage.



### Contre-indications

- Tout antécédent d'hypersensibilité à l'un des composants, notamment la tartrazine (ou sensibilisation de groupe).
- Ne pas appliquer sur les muqueuses (alcool à 70°).
- Ne pas utiliser sous pansement occlusif (majoration du risque de sensibilisation).
- Ne pas utiliser chez le nourrisson en-dessous de 30 mois (présence de camphre).

### Interaction

Compte tenu des interférences possibles (antagonisme, inactivation...), l'emploi simultané ou successif avec d'autres antiseptiques est à éviter.

### Précautions d'emploi

- Usage externe. Ne pas avaler.
- L'alcool ne doit pas être utilisé pour la pratique des alcoolémies.
- Tenir compte de la présence de tartrazine dans cette formule, en particulier chez les sujets polysensibilisés.
- Ne pas appliquer sur les muqueuses (alcool à 70°C).
- Ne pas utiliser sous pansement occlusif (majoration du risque de sensibilisation).
- L'alcool peut être irritant sur les tissus lésés.

### Effets secondaires

La tartrazine est susceptible d'entraîner une sensibilisation.

Les réactions sont croisées entre la tartrazine et l'aspirine.

Risque de réactions allergiques, notamment cutanées.

Référence	Taille	Conditionnement
609086	1 litre	Carton de 12
609084	5 litres	L'unité
609085	10 litres	L'unité

